

Gmina Łyse realizuje niezbędne działania prewencyjne w związku z dystrybucją jodku potasu

Zgodnie z działaniami podejmowanymi przez władze centralne, Gmina Łyse również realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Zostało przygotowanych 9 punktów dystrybucji.

Działania te mają charakter rutynowy, standardowy i przewidziany w przepisach prawa na wypadek ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Tabletki z jodkiem potasu są przygotowane dla wszystkich, którzy w wypadku promieniowania radioaktywnego powinni je przyjąć. Obecnie nie ma takiego zagrożenia i nie ma powodów, by rozpocząć dystrybucję tabletek wśród obywateli. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki a służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Akcja rozdawania mieszkańcom tabletek z jodkiem potasu zostanie uruchomiona po wystąpieniu zagrożenia i po wydaniu decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania preparatu.

Informacja o ewentualnym uruchomieniu akcji, na terenie gminy Łyse zostanie przekazana w formie komunikatów: przesyłanych za pomocą Systemu Powiadomień SMS, za pośrednictwem sołtysów, na stronie internetowej Urzędu Gminy www.gminalyse.pl.

W chwili uruchomienia akcji jodowej, uprawnieni mieszkańcy Gminy Łyse będą mogli odebrać tabletki w niżej wymienionych lokalizacjach Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu (PWTJP).

Numer Punktu	Nazwa i adres Punktu Wydawania Tabletek Jodku Potasu	Miejscowości wchodzące w skład Rejonu działania	Liczba stanowisk wydawania tabletek
1	Szkoła Podstawowa w Łysych ul. Szkolna 1, 07-437 Łyse (hala sportowa)	Łyse Serafin	1 Łyse ulice: Chabrowa, Jaśminowa, Liliowa Kwiatowa, Polna, Ogrodowa, Szkolna, Wesoła, Kurpiowska, Piwna, Spokojna, Słoneczna, Ostrołęcka, Padlewskiego, Diamentowa.
			2 Łyse ulice: Łąkowa, Poległych, Leśna, St. Krupki, Krótka, Jana Pawła, Kościelna, Plac 3-go Maja, Topolowa, Sosnowa, Ostrołęcka.
			3 Łyse ulice: Sienkiewicza, Świerkowa Serafin
			4 Łyse numery od 1 do 100
			5 Łyse numery od 101 do 181 Łyse ulice: Chętnika, Baśniowa
2	Szkoła Podstawowa w Zalasiu Zalas 1, 07-438 Zalas (hala sportowa)	Klenkor Piątkowizna Wejdo Wyżega Zalas	1 Piątkowizna, Wyżega
			2 Klenkor, Wejdo
			3 Zalas
3	Szkoła Podstawowa w Lipnikach ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 30 07-436 Lipniki (hala sportowa)	Lipniki Tartak	1 Lipniki od nr 1 do 162 2 Lipniki ulice: Wyszyńskiego, Sierbińskiego, Pogodna, Konwy, Wspólna, Zdrojowa Tartak
4	Szkoła Podstawowa w Szafrankach Szafranki 33, 07-436 Lipniki	Szafranki	1
5	Szkoła Podstawowa w Dębach Dęby 9, 07-437 Łyse	Dęby Tyczek	1
6	Szkoła Podstawowa w Pupkowiznie Pupkowizna 38, 07-437 Łyse	Pupkowizna	1
7	Szkoła Podstawowa w Łączkach Łączki 103, 07-438 Zalas	Łączki	1
8	Szkoła Podstawowa w Warmiaku Warmiak 16, 07-438 Zalas	Antonia Dudy Puszczańskie Grądzkie Warmiak	1
9	Świetlica Wiejska w Babie Baba 27A, 07-436 Lipniki	Baba Dawia Plewki Złota Góra	1

DODATKOWE INFORMACJE



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

 rejstrymedyczne.ezdrowie.gov.pl



JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!



Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

PROFILAKTYKA JODOWA

BROSZURA INFORMACYJNA

W przypadku awarii elektrowni jądowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycza tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku.

Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dorośli do 60 r. ż. i dzieci powyżej 12 r. ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r. ż.: 1 tabletka (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r. ż.: ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)



Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem



Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przelać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.

Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

-  jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
-  jeśli masz nadczynność tarczycy
-  jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią)
-  jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa)

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

UWAŻAJ, JEŚLI:

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autonomia tarczycy
- występuje u Ciebie zaburzenie czynności nerek
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie z tym związane
- jesteś odwodniony
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę



PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

przed przyjęciem leku

→ w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia

→ w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu)

po przyjęciu leku

→ z noworodkiem w celu skontrolowania czynności tarczycy

